

Pierre SABOURET

ACTION-Group, Institut du Cœur Paris

Assesment of an éducation and guidance program for apixaban adhérence in non valvular atrial fibrillation : the randomised AEGEAN study.

Sunday 30th August | 17.16–17.54 | Hotlines 2

L'edoxaban est un inhibiteur oral hautement sélectif du facteur Xa, inhibant une étape cruciale de la cascade de la coagulation pour prévenir la formation de thrombus. Le programme du développement clinique de l'edoxaban a démontré qu'une monoprise avait non seulement une action anticoagulante efficace en inhibant la production de thrombine sur une période allant jusqu'à 24 heures, mais présentait également un meilleur profil de tolérance que la même dose quotidienne en deux prises par jour. L'edoxaban présente une simplicité d'utilisation avec une posologie en une prise par jour, et identique pour toutes les indications autorisées, pouvant être pris pendant ou en dehors des repas et présente un risque limité d'interactions médicamenteuses^{5,8}. La dose recommandée d'edoxaban est de 60 mg en une seule prise par jour pour tous les patients, mais dans le cas des personnes présentant une altération de la fonction rénale, des personnes de petit poids ou des personnes prenant certains inhibiteurs puissants de la glycoprotéine P (ciclosporine, dronédarone, érythromycine ou kétoconazole), la possibilité de diminuer la dose de moitié permet aux cliniciens de le prescrire aux patients à risque accru de saignements¹.